

The International League of Associations for Rheumatology ILAR klassifikasjonskriterier for juvenil idiopatisk artritt (JIA)

Petty et al: ILAR classification of JIA; J Rheumatol 2004; 31:390-392

Subtype	Inklusjonskriterier	Eksklusjonskriterier*
Systemisk JIA	- Artritt i ≥ 1 ledd - Svingende feber over 39°C i ≥ 2 uker - Og minst 1 av følgende: - Flyktig erytematøst utslett - Generell lymfeknutesvulst - Hepato- eller splenomegali - Serositt	a, b, c, d
Oliogartikulær JIA - Persisterende oligo JIA - Utvidet oligo JIA	- Artritt i 1-4 ledd de første 6 månedene av sykdommen - Persisterende dersom sykdommen fortsatt affiserer 1-4 ledd, utvidet dersom sykdommen affiserer ≥ 5 ledd <i>etter</i> de første 6 månedene	a, b, c, d, e
Polyartikulær JIA - Revmatoid faktor (RF) negativ poly JIA - RF positiv poly JIA	- Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første årene av sykdommen og som er - RF negativ eller - RF positiv 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom	a, b, c, e
Psoriasisartritt	- Artritt og psoriasis, <i>eller</i>: - Artritt og minst 2 av følgende: - Daktylitt - Neglpitting eller onycholyse - Psoriasis hos 1. gradsslektning	b, c, d, e
Entesittrelatert artritt	- Artritt og entesitt, <i>eller</i>: - Artritt eller entesitt med minst 2 av følgende: - Inflammatoriske rygg smerter eller ileosakralleddsømhet - HLAB27 positiv - Debut av artritt over 6 år - Akutt fremre uveitt med rødhet og smerter - AS, sakroilett ved IBD, Reiter eller akutt fremre uveitt hos pasient eller 1. gradsslektning	a, d, e
Udifferensiert artritt	Passer ikke med øvrige kriterier, eller kan klassifiseres på flere måter	

*Eksklusjonskriterier

- Psoriasis hos pasient eller 1. gradsslektning
- Ankyloserende spondylitt (AS), entesittrelatert artritt (ERA), sakroileitt med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Reiter eller akutt fremre uveitt hos pasient eller 1. gradsslektning
- Artritt hos HLAB27 positiv gutt med debut etter 6 års alder
- RF IgM positiv 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom
- Systemisk JIA